

---

## Myringoplastika - uzavretie prederavenia blanky bubienka

Vážený rodičia, vážený pacient, vážená pacientka,

dovoľujeme si Vás požiadať o pozorné prečítanie informačného materiálu, ktorého cieľom je poskytnúť Vám poznatky o tomto ochorení, ako aj pokyny, ktoré by ste mali Vy, respektíve Vaše dieťa, dodržiavať po zákroku v procese zotavovania.

### Prečo treba vykonať zákrok?

Blanka bubienka je veľmi tenká membrána uzatvárajúca stredné ucho oproti vonkajšiemu zvukovodu. Prenáša zvukové vlnenie z vonkajšieho prostredia na kostičky stredného ucha. K prederaveniu môže dôjsť následkom úrazu alebo zápalu stredného ucha. Samotné prederavenie blanky bubienka spôsobuje horší sluch, hučanie v uchu. Pri prederavenej blanky bubienka ľahko dochádza k opakovaným zápalom stredného ucha, ktorých následok je pomalé zhoršovanie sluchu. Postihnutý má potiaže pri bežných úkonoch, nakoľko vniknutie vody do ucha vyvolá pocit závrate a následne zápal stredného ucha. Iba v prípade malých dierok a v prípade úrazov môže dôjsť k spontánnemu zahojeniu. V ostatných prípadoch je nutné operačné riešenie - myringoplastika.

### Komplikácie:

Pred operáciou sa o možných komplikáciách a rizikách porozprávajte s Vaším operatórom. Informácie k celkovej anestézii Vám podá anesteziológ.

### Operačný zákrok:

Zákrok sa robí v lokálnom znecitlivení alebo v celkovej anestézii. Vykonáva sa prístupom cez zvukovod alebo z rezu za uchom. Prístupom cez zvukovod sa urobí malý rez, ktorý je ale prakticky neviditeľný. Blanka bubienka sa uzatvára chrupavkou a ochrupkou z ušnice. Na záver sa zvukovod vyplní tamponádou.

Zákrok sa nevykonáva u žien počas menštruácie.

### Pooperačný priebeh:

Tamponáda zostáva približne v uchu týždeň. V období zotavovania by ste sa mali vyvarovať kýchaniu a silnému fúkaniu nosa.

Hojenie trvá priemerne 2-3 týždne, pri ktorom dôjde k uzatvoreniu blanky bubienka, zlepší sa sluch, prestanú opakované zápaly stredného ucha.

### 14 dní po operácii nesmiete:

- vykonávať akúkoľvek činnosť vyžadujúcu telesnú námahu,
- podľa možnosti by ste sa mali vyvarovať prechladnutiu,
- ošetrojúci lekár Vám vysvetlí, aké lieky budete užívať, kedy sa máte dostaviť na kontrolu a kedy si môžete začať silnejšie fúkať nos,
- bude Vám vysvetlené, kedy sa môžete kúpať a umývať si vlasy,
- cestovať lietadlom môžete najskôr 4-6 týždňov po operácii.

### Kedy kontaktovať lekára:

Ak máte niektorý z nasledujúcich problémov zavolajte svojmu lekárovi:

- zvýšenú telesnú teplotu,
- poruchy rovnováhy,
- bolesť.